Diagnosen neuer Landschnecken von Haiti,

gesammelt von Hermann Rolle 1887—88.

Von

Hermann Freiherrn von Maltzan.

---

1. *Cylindrella Strohmi* n.

Testa decollata, vix rimata, ovato-cylindrica, solidula, oblique costata, costis oblique arcuatis, quam interstitia angustioribus, purpurea, interdum maculis quadratis saturatioribus seriatim dispositis picta, apicem versus pallidior. Anfractus superst. 8—9 convexiusculi, sutura distincta pallidiore ad costas leviter crenulata discreti, altitudine subaequales, quarto et quinto latioribus, inferi attenuati, ultimus aperturam versus solutus, pallidior, ad basin crista parum prominente cinctus. Apertura transverse ovato-rotundata, subverticalis, peristomate campanulatim expanso, vix reflexiusculo, continuo, omnino libero, vix incrassato.

Alt. 32, diam. max. 10, alt. apert. 7, diam. 8 mm.

Var. *acupicta* n.

Differt a typo testa minore, pallidiore, distinctius regulariterque maculata, apertura circulari.

Alt. 18—20, diam. 7 mm.

Hab. Jeremie et Miragoane insulae Haiti.

2. *Cylindrella Dohrni* n.

Testa rimato-perforata, elongato-turrita, parum decollata, tenuiuscula, oblique costato-striata, costis tenuibus, distantibus, cornea, subpellucida. Anfractus numerosi (20—22), vix convexiusculi, lentissime crescentes, inferi 6—7 latitudine subaequales, ultimus carina distinctissima ad basin cinctus, solutus, late porrectus; sutura simplex, impressa. Apertura subovata, extus leviter angulato-canaliculata, peristomate expanso, vix incrassatulo.

Alt. 19, diam. max. 3,5 mm.

Hab. Sanssouci in parte meridionali insulae Haiti.

3. *Macroceramus costatus* n.

Testa anguste perforata, conoidea, lutescenti-albida, castaneo vel cinereo-fusco profuse maculata et tincta, costis distinctis irregularibus sculpta, inter costas subobsolete spiraliter striata. Anfractus 12—13 regulariter crescentes, convexiusculi, sutura impressa subirregulari discreti, ultimus vix attenuatus, basi carina prominente, fascia fusca insigni, cinctus. Apertura ovato-circularis, supra leviter truncato-emarginata, subverticalis; peristoma simplex tenue, extus strictum, infra et ad basin expansum et leviter reflexiusculum, marginibus distantibus, columellari reflexo, appresso.

Alt. 14, diam. anfr. ult. 5 mm.

Hab. Gonaives insulae Haiti.

4. *Macroceramus nitidulus* n.

Testa angustissime rimato-perforata, elongato-conica, tenuis, nitidula, oblique costato-striata, costis vix prominulis, interstitiis malleatis, albida, inter costas obsolete fulvo signata strigisque interruptis fuscis regulariter picta. Anfractus 10 convexiusculi regulariter crescentes, sutura lineari discreti, ultimus vix major, basi obsolete angulatus et infra angulum fascia interrupta fusca cinctus. Apertura parva, subverticalis, lunato-ovalis, peristomate simplici, marginibus distantibus, columellari vix reflexo.

Alt. 10, diam. 4,5 mm.

Hab. prope Port-au-Prince insulae Haiti.

5. *Oleacina Mülleri* n.

Testa ovata, nitidissima, sub lente tantum levissime striatula, subtranslucida, viridescenti-fusca; anfractus 6—7 vix convexiusculi, sutura leviter fuscomarginata, ex anfractu antepenultimo rapidius descendente discreti, ultimus $^3/_5$ testae aequans, basi rotundatus. Apertura irregulariter ovata, angusta, basi rotundata; peristoma acutum, medio protractum, columella basi contorta et abrupte truncata; paries aperturalis callo tenuissimo sed distincto obtecta.

Alt. 20, diam. 8, alt. apert. 12 mm.

Hab. Sanssouci in parte meridionali insulae Haiti.

6. *Cyclotus* (*?an nov. gen.*) *Martensi* n.

Testa late et perspectiviter umbilicata, depressa, spira conoidea parva sed sat elata, cinereo-fusca vel fuscescens, spira lutescente, apice parvo, laevi, prominulo, interdum maculis fuscis obsoletis seriatim vel strigatim dispositis ornata, costellis regularibus quam interstitia angustioribus undique nisi ad apicem sculpta. Anfractus $5^1/_2$ convexi sat rapide crescentes, sutura impressa discreti, ultimus teres, antice omnino solutus et valde descendens. Apertura circularis obliqua, peristomate duplici, interno acuto, recte producto, externo supra auriculato, superne extusque reflexo, umbilicum versus angusto. Operculum immersum testaceum, anfractibus canali discretis, lamellatim prominentibus.

Diam. maj. 14—16, min. 11, alt. 8, diam. apert. cum peristomate 6 mm.

Hab. Plaisance in parte boreali insulae Haiti.

7. *Licina? Rollei* n.

Testa anguste sed pervie umbilicata, conoidea, decollata, lutescenti-cinerea spira violacescente, fasciis fuscis angustis interruptis 4 vel seriebus macularum sagittiformium ornata, striis longitudinalibus sulcisque spiralibus decussato-granulosa. Anfractus superstites 5, convexi, regulariter crescentes, sutura impressa demum canaliculata, levissime crenulata discreti, ultimus teres, antice haud descendens. Apertura ovato-rotundata, altior quam latior, fere verticalis, faucibus fuscescentibus; peristoma continuum album, duplex, internum expansum, super externum haud vel vix protractum, externum supra auriculatum, auricula libera, undique, nisi ad parietem aperturalem, late reflexum, ad parietem angustius, vix adnatum.

Alt. 34, diam. maj. 24, min. 19 mm; alt. apert. cum peristomate 17, diam. 14 mm.

Var. violacea, differt colore nisi pone aperturam violaceo, striis spiralibus distinctioribus.

Hab. prope Miragoane in parte meridionali insulae Haiti.

8. *Choanopoma Kobelti* n.

Testa perforata, conoidea, tenuis, cinereo-albida, apicem versus lutescens, costellis concentricis confertissimis undique sculpta, interstitiis sub lente obsolete transversim sculptis, striis interdum decussationem obsoletam efformantibus. Anfractus $6\frac{1}{2}$ convexi, primi $1\frac{1}{2}$ laeves, pellucidi, sequentes regulariter crescentes, sutura profunda discreti, ultimus teres, basin versus striis spiralibus distinctioribus sculptus, antice breviter solutus. Apertura subcircularis, parum altior quam latior, peristomate duplici, interno recto haud producto, externo late fimbriato, superne auriculato, haud adnato.

Alt. 24,5, alt. apert. cum perist. 9,5, diam. 8 mm.

Var. fusca n., differt colore nisi spirae fuscescente, seriebus macularum saturatiorum obsolete ornata.

Hab. prope Dondon in parte boreali insulae Haiti.

9. *Choanopoma Bertini* n.

Testa compresse perforata, elongato-conoidea, tenuis, lutescenti-fusca, apice pallidiore, fasciis castaneis subinterruptis numerosis, in fimbria peristomatis distinctioribus varie picta, costellis concentricis regularibus subdistantibus undique sculpta, liris spiralibus 2—3 in umbilico tantum conspicuis. Apex laevis, acutus, pallidus. Anfractus 7—8 convexi, regulariter crescentes, sutura impressa profunda discreti, ultimus teres, antice solutus, porrectus, pone aperturam leviter dilatatus. Apertura circularis, fasciis intus translucentibus, peristomate duplici, interno recto, externo fimbriato, obsolete auriculato, radiatim plicatulo, undique libero.

Alt. 15, diam. 10, alt. apert. cum perist. 6 mm.

Var. *gracillima* n., differt testa minore, graciliore, fasciis saturatioribus.

Alt. 10 mm.

Hab. Sanssouci in parte boreali insulae Haiti.

10. *Choanopoma strictecostatum* n.

Testa late perforata, conoidea, albido-cinerea, costellis lamellosis sat elevatis, margine sublaciniatis supra subauriculatis distantibus undique pulcherrime sculpta, apice parvo tantum laevi. Anfractus 7 convexi, regulariter crescentes, sutura profunda crenata discreti, ultimus teres, antice haud solutus. Apertura circularis, verticalis, peristomate duplici, interno recto leviter porrecto, externo extus late reflexo, fimbriam laciniatam supra leviter auriculatam efformante, intus augustiore, haud aduato.

Alt. 10—11 mm.

Hab. Miragoane insulae Haiti meridionalis.

11. *Chondropoma subreticulatum* n.

Testa anguste rimato-perforata, elongato cylindrico-conoidea, decollata, fuscescenti-cinerea, seriebus macularum fuscarum obsolete cincta. Anfractus superstites 5 convexi, sutura profunda crenulata discreti, liris spiralibus striisque costelliformibus confertissimis infra suturam distinctioribus subreticulati, regulariter crescentes, ultimus vix major, basi rotundatus, antice subsolutus. Apertura ovata, supra angulata, fere verticalis, peristomate continuo, undique soluto, subincrassato, vix expanso.

Alt. 12, diam. 6, alt. apert. obl. 4 mm.

Var. *sericea*, differt a typo colore saturatiore, liris spiralibus minus distinctis, sutura albosignata.

Hab. Cap Haiti.

12. *Helicina Haitensis* n.

Testa imperforata, depresse globosa, obtuse angulata, subtranslucida, lutescenti-fusca, subtilissime striatula, nitens. Anfractus 4 $^1/_2$ vix convexiusculi, sutura primum lineari dein impressa et sub lente subcrenulata discreti, sat celeriter sed regulariter crescentes, ultimus obtuse angulatus, basi convexiusculus, in umbilici loco tantum leviter depressus, antice brevissime deflexus. Apertura obliqua semiovata, parum lunata, peristomate simplici, albo, marginibus distantibus, externo stricto, depresso, basali subhorizontali, cum columellari brevissimo verticali angulum fere rectum formante, columellaris callo tenui, translucido, expanso, infra sulco definito, cum insertione externi conjunctus.

Diam. maj. 8,5, min. 7,5, alt. 6 mm.

Hab. Sanssouci insulae Haiti borealis.

Literaturbericht.

Ancey, C. F., Description de Mollusques terrestres. In le Naturaliste (2) Année 10 p. 213.

Neu Caecilianella advena aus Lüderitzland, Cyclophorus sericatus